


# AG 800 ProLacto™

桿菌 + 乳酸桿菌  
蝦和魚的飼料添加劑

MADE IN  
USA ★



優化  
進料轉換



提高  
消化系統健康



成長更快，更大

## 總覽

現代生物科學正逐漸徹底改變水產養殖餵養的習慣。AG800 ProLacto 的益生菌研究中，特別對魚和蝦類重要。AG800 ProLacto 混合了 3 種乳酸菌的菌株及 5 種不同菌株形成孢芽的細菌致產生綜合消化道推助器。結合這八種菌株，此產品可以幫助魚蝦分解複雜的蛋白質，更好地攝取營養。結果，它們增長更快，更大，使用的飼料更少。

## 配料處方

孢子計數量:

最少劑量 2M CFU/g

(cfu 代表大腸桿菌形成單位。因此, cfu / g 是每克菌落形成單位.)

- Lactobacillus acidophilus
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus plantarum
- Bacillus subtilis
- Bacillus licheniformis
- Bacillus pumilus
- Bacillus amyloliquefaciens
- Bacillus megaterium
- Dendritic salt (carrier)

## AG800 ProLacto 使用說明步驟:

1. 確認水溫為 45° F (7.2° C) 或更高。隨著溫度下降到此標記以下，性能將下降。
2. 確認水的 pH 值在 5.5-9.5 的可治療範圍內（最佳值為 7.5）。
3. 使用前應與飼料充分混合。
4. 盡可能使用空氣曝氣法促使 AG800 ProLacto 益生菌可以達到最大功效。
5. 存放在 50-100°F (10-38°C) 的陰涼乾燥處。

## 4. AG800 ProLacto

益生菌包裝隨時密封並妥善存放。  
保質期：自生產之日起 18 個月。

## AG800 ProLacto 劑量添加使用說明

1. 每公斤飼料添加 10 克。每次餵食重複一次。

(4046.86 平方公尺=1 英畝=1224.172 坪)；

(1 公頃 (Hectare) = 1.0310 甲 = 100 公畝 = 10,000 平方公尺 = 3,025 坪)；

(1 甲 = 10 分 = 2934 坪 = 0.96992 公頃) ；

(1 分 = 0.0970 公頃 = 293.4 坪)； (1 坪 = 3.3058 平方公尺)。

季節期間益生菌成本費用 ( 4 months)：蝦季節，成長天數因蝦種類而不同，養殖者需自行判斷需求數量。

1. 每日平均耗損 x 公斤飼料。
2. 每日平均添加 AG800: 0.01X
3. 預防使用 (健康蝦) AG800 添加總劑量:

$$30 \text{ 天/月} * 4 \text{ 月} * (0.01X \text{ Kg}) = 1.2 X \text{ Kg}$$

## AG800 ProLacto 技術數據

1. 避免養殖池吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。
2. 受污染的工作服不得帶出工作場所。
3. 戴防護手套和護目鏡。如果接觸到眼睛或皮膚，請徹底沖洗。反復或長時間的皮膚接觸可能會引起與易感人群的過敏反應。如果症狀持續，請致電醫生。